

APPENDIX A INHOUD CLINICAL RULES IN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS

<i>clinical rule</i>	<i>melding bij</i>
opiaat en laxans	medicatieopdracht van opiaat zonder laxans
NSAID en maagprotectie	medicatieopdracht van een NSAID zonder maagprotectie
nierfunctie	er wordt bij volwassenen een melding gegenereerd bij renaal geklaarde geneesmiddelen en verlaagde eGFR
paracetamol bij kinderen	kinderen (< 18 jaar) en paracetamol gebruik > 60 mg/kg/dag langer dan 3 dagen.
antibiotica gebruik in de kliniek	<ul style="list-style-type: none"> • oseltamivir > 5 dagen • erytromycine > 3 dagen • kinderen (< 1 jaar) en antibiotica gebruik langer dan 7 dagen
vitamine D	bisfosfonaatgebruikers die geen calcium/vitamine D gebruiken en een lage/geen vitamine D spiegels hebben
lithium	een medicatieopdracht voor lithium > 1 dag
hyponatriëmie	<ul style="list-style-type: none"> • natrium < 110 mmol/L + 1 Na verlagend middel • natrium 110-130 + meerdere Na verlagende middelen • natrium 110-130 + 1 Na verlagende middel + > 25% daling/stijging • Na > 130 mmol/L + > 25% daling/stijging • Na ≤ 5 dagen • Na volgt
kalium	<ul style="list-style-type: none"> • kalium ≤ 3 dagen oud • melding bij kalium > 5,5 of < 3,0 mmol/L + kaliumbeïnvloedende middel of digoxine • melding bij geen kalium + meerdere kaliumbeïnvloedende middelen (alleen nieuw voorgeschreven)
methotrexaat	<ul style="list-style-type: none"> • foliumzuur op dezelfde dag als methotrexaat of geen foliumzuur • dosering niet eenmaal per week of > 30 mg • afwijkend bloedbeeld of verhoogd ALAT
orale oncolytica met stopdatum	kenmerk in G-Standaard 'let op dosering + mogelijk stopperiode oncolyticum'
antibiotica switch	parenteraal antibioticagebruik > 3 dagen anders dan vancomycine en aminoglycosiden
cumarines	<ul style="list-style-type: none"> • INR > 5,5 • INR < 1,5 + cumarinegebruik > 5 dagen • geen INR ≤ 3 dagen oud • geen INR ≤ 1 dag oud + interactie • LMWH > 3 dagen + INR 2,5
ontstollende medicatie	combinatie van acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium ≤ 100 mg met therapeutische antistolling
TDM aminoglycosiden en vancomycine	geen stopdatum van de medicatieopdracht binnen 3 dagen en een nierfunctieverandering > 25% of het ontbreken van een labuitslag
TDM voriconazol and clozapine	medicatieopdracht voor voriconazol of clozapine
cumulatieve dosering anthracyclines	overschrijding van 80% van de cumulatieve dosering van anthracyclines.
morbide obesitas	hoog BMI en/of lichaamsgewicht en een voorschrift van dalteparine, een DOAC, vancomycine of ciprofloxacine. De grenzen zijn per geneesmiddel verschillend.

NSAID: *Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug*, eGFR: geschatte glomerulaire filtratiesnelheid, ALAT: alanine aminotransferase, INR: *international normalized ratio*, LMWH: laag-molecuulgewicht heparines, TDM: *Therapeutic Drug Monitoring*, BMI: *body mass index*, DOAC: direct werkend oraal anticoagulans.