

APPENDIX B GENEESMIDDELINTERACTIES DIE BINNEN DE ZIEKENHUIS- APOTHEEK VAN HET MAASSTAD ZIEKENHUIS AANGEMERKT ZIJN ALS NIET RELEVANT VOOR DE KLINISCHE SETTING

geneesmiddelinteractie	reden
bètablokkers (selectief) + insuline	glucose wordt regelmatig gemeten in de ziekenhuissetting
bètablokkers (niet-selectief) + insuline	glucose wordt regelmatig gemeten in de ziekenhuissetting
bètablokkers + orale bloedglucoseverlagers	glucose wordt regelmatig gemeten in de ziekenhuissetting
bètablokkers + NSAID's	de bloeddruk wordt regelmatig gemeten in de ziekenhuissetting
SSRI's/venlafaxine/duloxetine/vortioxetine + oxycodon	het risico op serotoninesyndroom wordt zeer klein geacht
SSRI's/venlafaxine/duloxetine/vortioxetine + tramadol	het risico op serotoninesyndroom wordt zeer klein geacht
SSRI's/venlafaxine/duloxetine/vortioxetine + fentanyl	het risico op serotoninesyndroom wordt zeer klein geacht
SSRI's/venlafaxine/duloxetine/vortioxetine + pethidine	het risico op serotoninesyndroom wordt zeer klein geacht
RAAS-remmers + diuretica	patiënt is vaak bedlegerig in ziekenhuissetting
alfablokkers (niet-selectief) + bètablokkers/calciumantagonisten	patiënt is vaak bedlegerig in ziekenhuissetting

NSAID: *Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug*, SSRI: *Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor*, RAAS: renine-angiotensine-aldosteronsysteem.